

多発性骨髄腫					
	レジメン名	薬剤	投与量	投与スケジュール	投与間隔
1	EPd 1~2クール目	エロツズマブ	10 mg/kg	d1、8、15、22	28日
		ボマリドミド経口	4 mg/body	d1-21	
		デキサメタゾン注	40 mg/body	d1、8、15、22	
2	EPd 3クール目以降	エロツズマブ	20 mg/kg	d1	28日
		ボマリドミド経口	4 mg/body	d1-21	
		デキサメタゾン注	40 mg/body	d1	
		デキサメタゾン経口	40 mg/body	d8、15、22	
3	ELd 1~2クール目	エロツズマブ	10 mg/kg	d1、8、15、22	28日
		レナリドミド	25 mg/day	d1-21	
		デキサメタゾン注	40 mg/day	d1、8、15、22	
4	ELd 3クール目以降	エロツズマブ	10 mg/kg	d1、15	28日
		レナリドミド	25 mg/day	d1-21	
		デキサメタゾン注	40 mg/day	d1、15	
		デキサメタゾン経口	40 mg/body	d8、22	
5	MPB (皮下注)	メルファラン経口	9 mg/m ²	d1、2、3、4	35日
		プレドニゾロン経口	60 mg/m ²	d1、2、3、4	
		ボルテゾミブ皮下注	1.3 mg/m ²	d1、8、15、22	
6	VCD 第1コース	ボルテゾミブ	1.3 mg/m ²	d1、4、8、11	21日
		シクロホスファミド	500 mg/m ²	d1、8	
		デキサメタゾン経口	40 mg/body	d1、4、8、11	
7	VCD 第2・3コース	ボルテゾミブ	1.3 mg/m ²	d1、8、15、22	35日
		シクロホスファミド	300 mg/m ²	d1、8、15、22	
		デキサメタゾン経口	40 mg/body	d1、8、15、22	
8	VD療法 (皮下注)	ボルテゾミブ	1.3 mg/m ²	d1、4、8、11	21日
		デキサメタゾン経口	20 mg/body	d1、2、4、5、8、9、11、12	
9	DBd 1~3クール目	ダラツムマブ	16 mg/kg	d1、8、15	21日
		ボルテゾミブ	1.3 mg/m ²	d1、4、8、11	
		デキサメタゾン注	20 mg/body	d1、8	
		デキサメタゾン経口	20 mg/body	d2、4、5、9、11、12	
10	DBd 4~8クール目	ダラツムマブ	16 mg/kg	d1	21日
		ボルテゾミブ	1.3 mg/m ²	d1、4、8、11	
		デキサメタゾン注	20 mg/body	d1	
		デキサメタゾン経口	20 mg/body	d2、4、5、8、9、11、12	
11	DBd 9クール目以降	ダラツムマブ	16 mg/kg	d1	28日