

| 大腸癌 レジメン名 | 薬剤 | 投与量 | 投与スケジュール | 投与間隔 | |
|--------------|--------------------------|---|---|------------------------------|-----|
| 1 | Cmab単独 | セツキシマブ セツキシマブ | 1回目:400 mg/m ² 2回目以降::250 mg/m ² | d1 | 7日 |
| 2 | FOLFIRI(CPT-11(150))+AFL | アフリベルセプト レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル イリノテカン | 4 mg/kg 200 mg/m ² 400 mg/m ² 2400 mg/m ² 150 mg/m ² | d1 d1 d1 d1 d1 | 14日 |
| 3 | FOLFIRI(CPT-11(150))+RAM | ラムシルマブ レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル イリノテカン | 8 mg/kg 200 mg/m ² 400 mg/m ² 2400 mg/m ² 150 mg/m ² | d1 d1 d1 d1 d1 | 14日 |
| 4 | FOLFIRI(CPT-11(150))+Bev | レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル イリノテカン ペバシズマブ | 200 mg/m ² 400mg/m ² 2400 mg/m ² 150 mg/m ² 5 mg/kg | d1 d1 d1 d1 d1 | 14日 |
| 5 | FOLFOXIRI | イリノテカン レボホリナート オキサリプラチン フルオロウラシル ペバシズマブ | 150 mg/m ² 200 mg/m ² 85 mg/m ² 2400 mg/m ² 5 mg/kg | d1 d1 d1 d1 d1 | 14日 |
| 6 | FOLFOXIRI+Bev | イリノテカン レボホリナート オキサリプラチン フルオロウラシル ペバシズマブ | 150 mg/m ² 200 mg/m ² 85 mg/m ² 2400 mg/m ² 5 mg/kg | d1 d1 d1 d1 d1 | 14日 |
| 7 | IRIS(3週) | テガフル・ギメラシル・オテラシル イリノテカン | 80 mg/m ² 150 mg/m ² | d1-14 d1 | 21日 |
| 8 | IRIS(4週) | テガフル・ギメラシル・オテラシル イリノテカン | 80 mg/m ² 125 mg/m ² | d1-14 d1、15 | 28日 |
| 9 | IRIS(4週)+Bev | テガフル・ギメラシル・オテラシル ペバシズマブ イリノテカン | 80 mg/m ² 5 mg/kg 100 mg/m ² | d1-14 d1、15 d1、15 | 28日 |
| 10 | IRIS(4週)+Pmab | テガフル・ギメラシル・オテラシル パニツムマブ イリノテカン | 80 mg/m ² 6 mg/kg 100 mg/m ² | d1-14 d1、15 d1、15 | 28日 |
| 11 | SOX+Bev | ペバシズマブ オキサリプラチン テガフル・ギメラシル・オテラシル | 7.5 mg/kg 130 mg/m ² 80 mg/m ² | d1 d1 d1-14 | 21日 |
| 12 | SOX+Pmab | オキサリプラチン テガフル・ギメラシル・オテラシル パニツムマブ | 130 mg/m ² 80 mg/m ² 6 mg/kg | d1 d1-14 d1 | 21日 |
| 13 | SOX | オキサリプラチン テガフル・ギメラシル・オテラシル | 130 mg/m ² 80 mg/m ² | d1 d1-14 | 21日 |
| 14 | TAS-102+BEV | トリフルリジン・チピラシル塩酸塩配合剤 ペバシズマブ イリノテカン | 70 mg/m ² 5 mg/kg 200 mg/m ² | d1-5、d8-12 d1、15 d1 | 28日 |
| 15 | XELIRI+Bev | ペバシズマブ カベシタピン | 7.5 mg/kg 1600 mg/m ² | d1 d1-14 | 21日 |
| 16 | XELIRI | イリノテカン カベシタピン | 200 mg/m ² 1600 mg/m ² | d1 d1-14 | 21日 |
| 17 | XELOX | カベシタピン オキサリプラチン | 2000 mg/m ² 130 mg/m ² | d1-14 d1 | 21日 |
| 18 | XELOX+Bev | カベシタピン オキサリプラチン ペバシズマブ | 2000 mg/m ² 130 mg/m ² 7.5 mg/kg | d1-14 d1 d1 | 21日 |
| 19 | Pmab | パニツムマブ | 6 mg/kg | d1 | 14日 |
| 20 | sLV5FU | レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル | 200 mg/m ² 400 mg/m ² 2400 mg/m ² | d1 d1 d1 | 14日 |
| 21 | sLV5FU+BEV(5) | レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル ペバシズマブ | 200 mg/m ² 400 mg/m ² 2400 mg/m ² 5 mg/kg | d1 d1 d1 d1 | 14日 |
| 22 | BEV(5)+mFOLFOX | ペバシズマブ オキサリプラチン レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル | 5 mg/kg 85 mg/m ² 200 mg/m ² 400 mg/m ² 2400 mg/m ² | d1 d1 d1 d1 d1 | 14日 |
| 23 | C-mab+FOLFIRI | セツキシマブ イリノテカン レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル | 1回目:400 mg/m ² 2回目以降:250 mg/m ² 150 mg/m ² 200 mg/m ² 400 mg/m ² | d1、8 d1 d1 d1 d1 | 14日 |
| 24 | C-mab+mFOLFOX6 | セツキシマブ オキサリプラチン レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル | 1回目:400 mg/m ² 2回目以降:250 mg/m ² 85 mg/m ² 200 mg/m ² 400 mg/m ² | d1、8 d1 d1 d1 d1 | 14日 |
| 25 | FOLFIRI(CPT-11(150)) | レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル イリノテカン | 200 mg/m ² 400 mg/m ² 2400 mg/m ² 150 mg/m ² | d1 d1 d1 d1 | 14日 |
| 26 | Pmab(6)+mFOLFOX6 | パニツムマブ オキサリプラチン レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル | 6 mg/kg 85 mg/m ² 200 mg/m ² 400 mg/m ² 2400 mg/m ² | d1 d1 d1 d1 d1 | 14日 |
| 27 | Pmab(6)+FOLFIRI | パニツムマブ イリノテカン レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル | 6 mg/kg 150 mg/m ² 200 mg/m ² 400 mg/m ² 2400 mg/m ² | d1 d1 d1 d1 d1 | 14日 |
| 28 | mFOLFOX6(L-OHP(85)) | オキサリプラチン レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル | 85 mg/m ² 200 mg/m ² 400 mg/m ² 2400 mg/m ² | d1 d1 d1 d1 | 14日 |
| 29 | IRI+Pmab | イリノテカン パニツムマブ | 150 mg/m ² 6 mg/kg | d1 d1 | 14日 |
| 30 | 隔週C-mab+FOLFIRI | セツキシマブ イリノテカン レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル | 500 mg/m ² 150 mg/m ² 200 mg/m ² 400 mg/m ² 2400 mg/m ² | d1 d1 d1 d1 d1 | 14日 |
| 31 | 隔週C-mab+mFOLFOX6 | セツキシマブ オキサリプラチン レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル | 500 mg/m ² 85 mg/m ² 200 mg/m ² 400 mg/m ² 2400 mg/m ² | d1 d1 d1 d1 d1 | 14日 |