

泌尿器				
レジメン名	薬剤	投与量	投与スケジュール	投与間隔
膀胱癌				
G-Carbo	ゲムシタビン	1000 mg/m <sup>2</sup>	d1、8、15	28日
	カルボプラチン	AUC 4	d2	
G-Carbo (day1,8 3week)	ゲムシタビン	1000 mg/m <sup>2</sup>	d1、8	21日
	カルボプラチン	AUC 4	d1	
GC(GEM + CDDP)	ゲムシタビン	1000 mg/m <sup>2</sup>	d1、8、15	28日
	シスプラチン	70 mg/m <sup>2</sup>	d2	
キイトルーダ	ペムプロリズマブ	200 mg/body	d1	21日
キイトルーダ	ペムプロリズマブ	400 mg/body	d1	42日
ジェムザール単剤	ゲムシタビン	1000 mg/m <sup>2</sup>	d1、8、15	28日
バベンチオ	アベルマブ	10 mg/kg	d1	14日
パドセブ	エンホルツマブ ペドチン	1.25 mg/kg	d1、8、15	28日
Paclitaxel + Gemcitabine 3weeks	パクリタキセル	175 mg/m <sup>2</sup>	d1	21日
	ゲムシタビン	1000 mg/m <sup>2</sup>	d1、8	
膀胱内注入テラルピシン	ピラルピシン	40 mg/m <sup>2</sup>	d1	
精巣腫瘍				
BEP	エトポシド	100 mg/m <sup>2</sup>	d1-5	21日
	シスプラチン	20 mg/m <sup>2</sup>	d1-5	
	プレオマイシン	30 mg	d2、9、16	
CBDCA(精巣腫瘍 術後補助)	カルボプラチン	AUC 7	d1	21日
腎癌				
オブジーボ+ヤーボイ	ニボルマブ	240 mg/body	d1	21日
(4クールのみ施行。その後はオブジーボ単独を2週間ごと)	イピリムマブ	1 mg/kg	d1	
オブジーボ	ニボルマブ	240 mg/body	d1	14日
トーリセル	テムシロリムス	25 mg/m <sup>2</sup>	d1	7日
前立腺癌				
タキソテール (Docetaxel) 3weeks(プレドニゾン 5mg×2/日 連日)	ドセタキセル	70 mg/m <sup>2</sup>	d1	21日
	プレドニゾン	10 mg/body	d1-21	
ジェプタナ(プレドニゾン 5mg×2/日 連日)	カバジタキセルアセトン付加物	25 mg/m <sup>2</sup>	d1	21日
	プレドニゾン	10 mg/body	d1-21	
陰茎がん				
TIP	パクリタキセル	175 mg/m <sup>2</sup>	d1	21日
	イホスファミド	1.2 g/m <sup>2</sup>	d1-3	
	シスプラチン	25 mg/m <sup>2</sup>	d1-3	