

膵癌・胆道癌				
レジメン名	薬剤	投与量	投与スケジュール	投与間隔
CDDP (25) + GEM(1000)	シスプラチン	25 mg/m ²	d1、8	21日
	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	d1、8	
FOLFIRINOX	レボホリナート	200 mg/m ²	d1	14日
	フルオロウラシル	400 mg/m ²	d1	
	フルオロウラシル	2400 mg/m ²	d1	
	イリノテカン	180 mg/m ²	d1	
	オキサリプラチン	85 mg/m ²	d1	
GEM(1000)療法	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	d1、8、15	28日
S-1 (14)+GEM療法	テガフル・ギメラシル・オテラシル	80 mg/m ²	d1-14	21日
	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	d1、8	
modified FOLFIRINOX	レボホリナート	200 mg/m ²	d1	14日
	フルオロウラシル	2400 mg/m ²	d1	
	イリノテカン	150 mg/m ²	d1	
	オキサリプラチン	85 mg/m ²	d1	
GEM+アブラキサン	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	d1、8、15	28日
	パクリタキセル(アルブミン懸濁型)	125 mg/m ²	d1、8、15	
GS(GEM+S-1)隔週投与	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	d1、15	28日
	テガフル・ギメラシル・オテラシル	80 mg/m ²	d8-14、22-28	
GCS	シスプラチン	25 mg/m ²	d1	14日
	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	d1	
	テガフル・ギメラシル・オテラシル	80 mg/m ²	d1-7	
FL-nal-IRI	イリノテカン(リポソーム懸濁)	70 mg/m ²	d1	14日
	レボホリナート	200 mg/m ²	d1	
	フルオロウラシル	2400 mg/m ²	d1	
イミフィンジ+GC	デュルバルマブ	1500 mg	d1	21日
	シスプラチン	25 mg/m ²	d1、8	
	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	d1、8	
キイトルーダ+GC	ベムプロリズマブ	200 mg	d1	21日
	シスプラチン	25 mg/m ²	d1、8	
	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	d1、8	