

膵癌・胆道癌					
	レジメン名	薬剤	投与量	投与スケジュール	投与間隔
1	CDDP (25) + GEM(1000)	シスプラチン	25 mg/m ²	d1、8	21日
		ゲムシタビン	1000 mg/m ²	d1、8	
2	FOLFIRINOX	レボホリナート	200 mg/m ²	d1	14日
		フルオロウラシル	400 mg/m ²	d1	
		フルオロウラシル	2400 mg/m ²	d1	
		イリノテカン	180 mg/m ²	d1	
		オキサリプラチン	85 mg/m ²	d1	
3	GEM(1000)療法	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	d1、8、15	28日
4	S-1 (14)+GEM療法	テガフル・ギメラシル・オテラシル	80 mg/m ²	d1-14	21日
		ゲムシタビン	1000 mg/m ²	d1、8	
5	modified FOLFIRINOX	レボホリナート	200 mg/m ²	d1	14日
		フルオロウラシル	2400 mg/m ²	d1	
		イリノテカン	150 mg/m ²	d1	
		オキサリプラチン	85 mg/m ²	d1	
6	GEM+アブラキサン	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	d1、8、15	28日
		パクリタキセル(アルブミン懸濁型)	125 mg/m ²	d1、8、15	
7	GS(GEM+S-1)隔週投与	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	d1、15	28日
		テガフル・ギメラシル・オテラシル	80 mg/m ²	d8-14、22-28	
8	GCS	シスプラチン	25 mg/m ²	d1、	14日
		ゲムシタビン	1000 mg/m ²	d1	
		テガフル・ギメラシル・オテラシル	80 mg/m ²	d1-7	
9	FL-nal-IRI	イリノテカン(リボソーム懸濁)	70 mg/m ²	d1	14日
		レボホリナート	200 mg/m ²	d1	
		フルオロウラシル	2400 mg/m ²	d1	