

検査値から確認できる副作用の重症度分類

検査値		副作用重症度		
		グレード 1	グレード 2	グレード 3
白血球減少	/ μ L	3300-3000	3000-2000	2000-1000
好中球減少	/ μ L	2000-1500	1500-1000	1000-500
貧血 (Hb)	g / dL	ヘモグロビン値 13.7-10.0	ヘモグロビン値 10.0-8.0	ヘモグロビン値 8.0以下
血小板減少	10^4 / μ L	18-7.5	7.5-5.0	5.0-2.5
AST増加	U/L	30-90	90-150	150-600
ALT増加	U/L	男性：42-126 女性：23-69	男性：126-210 女性：69-115	男性：210-840 女性：115-460
T-Bil増加	mg/dL	1.5-2.25	>2.25-4.5	>4.5-15
クレアチニン	mg/dL	男性：1.07-1.605 女性：0.79-1.185	男性：1.605-3.21 女性：1.185-2.37	男性：3.21-6.42 女性：2.37-4.74
高カルシウム血症	mg/dL	10.1-11.5	11.5-12.5	12.5-13.5
低カルシウム血症	mg/dL	8.8-8.0	8.0-7.0	7.0-6.0
高カリウム血症	mmol/L	4.8-5.5	5.5-6.0	6.0-7.0
低カリウム血症	mmol/L	3.6-3.0 症状がない	3.6-3.0 症状がある	3.0-2.5 入院を要する
低マグネシウム血症	mg/dL	1.8-1.2	1.2-0.9	0.9-0.7
低ナトリウム血症	mmol/L	138-130	125-129 症状がない	125-129 症状がある 又は120-124 症状の有無は問わない

CTCAE ver.5.0を参考に改編